

Informovaný souhlas, smluvní podmínky, vnitřní řád pro klienty centra RediCare

Mgr. Kateřina Šimková, Nákupní 1127CH, Jesenice 25242, IČO : 86567110

Jméno a příjmení klienta / zákonného zástupce:

Rodné číslo klienta:.....

Potvrzuji, že jsem nezamlčel žádné závažné skutečnosti týkající se mého zdravotního stavu případně mého dítěte, či svěřené osoby, které by mohly ohrozit můj (jejich) zdravotní stav při aplikaci procedur rehabilitace včetně fyzikální terapie. Zároveň přečtením tohoto dokumentu souhlasím s užíváním informací o mé osobě/ mého dítěte (jména, adresa, rodné číslo, kontaktní údaje, zdravotní stav) pro potřeby zdravotnické dokumentace a pro vnitřní potřeby rehabilitace Mgr. Kateřina Šimková – RediCare.

Výslovně souhlasím s poskytnutím péče v rámci fyzioterapeutických procedur a dalších procedur poskytovaných v rámci odborné způsobilosti fyzioterapeuta v rozsahu uvedeném v ustanovení par. 25. odst. 2. vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb., v platném znění, tedy v souladu s léčebnými postupy a standardizovanými postupy v oboru fyzioterapie dle indikace lékaře a po aktuálním odborném zhodnocení fyzioterapeuta. V případě bez indikace lékaře – tedy FTP souhlasím s ošetřením na vlastní žádost a vlastní nebezpečí, dle odborných znalostí fyzioterapeuta.

V péči o naše klienty využíváme různé fyzioterapeutické přístupy (mobilizační techniky, cvičení na neurofyzilogickém podkladě, techniky měkkých tkání, terapii dle DNS prof. Koláře, ACT terapie, Metodiku Ludmily Mojžíšové, MC Kenzie techniky aj. V rámci této léčby může dojít ke zhoršení zdravotních potíží, což je přirozenou reakcí organismu na změny. Za nepředvídatelné tělesné reakce neneseme zodpovědnost.

Kontraindikací jsou vždy horečnaté a jiná infekční onemocnění, v takovém případě naše zařízení nenavštěvujte.

V rámci aplikace elektroterapie a magnetoterapie: **kontraindikací jsou kovové materiály v těle, kardiostimulátor,** hemoragické-krvácivé stavy, horečnaté onemocnění, infekční onemocnění, trofické změny kůže, **gravida** !, primární tumory, primární ložiska TBC, manifestní kardiální nebo respirační insuficience, poruchy citlivosti v místě aplikace.

Vnitřní řád pro klienty centra RediCare

Klient (nebo jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že pokud se nemůže na objednanou terapii dostavit, je **povinen ji 24 hod. předem zrušit – email: reha.redicare@gmail.com, nebo SMS zprávou na tel: 604604437.** Prosíme informace o zrušení terapie i v neděli na email. **Pozor, předem neomluvený termín, na který nedorazíte, bude zpoplatněn částkou 350 Kč,** po zaplacení uskutečneme další termíny. V případě samoplátců požadujeme 50 % z ceny terapie. V případě dvou pozdě omluvených, nebo dvou neomluvených absencí na terapii, je centrum oprávněno všechny vaše terapie ukončit! Terapie bude také pozastavena či ukončena, pokud klient neprovede úhradu storno poplatku za neomluvené terapie. Rehabilitace na FT poukaz je nutné dočerpat do 3 měsíců od vystavení poukazu, jinak jsme nuceni dle pravidel VZP a smluvních pojišťoven rehabilitace ukončit. **Provoz call centra (tedy detašované recepce) je PO – PÁ 8.00 -13.00, poté prosíme píše pouze emaily na : reha.redicare@gmail.com.**

Za děti, které vodíte na Váš objednaný termín rehabilitace neneseme zodpovědnost (vč. elektroléčby).

Zákonní zástupci jsou povinni doprovázet děti na rehabilitaci, dle zákona nesmí být ošetřeni děti do 15-ti let bez doprovodu rodičů. Děti od 15-ti do 18-ti let bez doprovodu musí mít rodiči podepsaný souhlas.

Platby za poskytované služby:

Klienti samoplátců hradí terapii dle platného ceníku centra RediCare.

Klienty pojištěné u smluvních pojišťoven ošetřujeme na základě indikace lékařem po předložení poukazu na vyšetření FT s platnými náležitostmi

Datum a podpis klienta:

.....

Terapie dětských pacientů, kojenců a batolat.

Vojtova metoda – Reflexní cvičení dle Václava Vojty

Metoda Václava Vojty je reflexní přístup k léčbě a diagnostice pohybové poruchy na úrovni řízení centrální nervové soustavy. Pomocí terapeutických modelů (poloha) a zón (místo aktivace) v CNS aktivujeme motorickou oblast, což umožňuje najít cestu k blokováným pohybovým modelům a odblokovat je, čímž umožníme dítěti využít svalové souhry, které dříve nebylo schopno.

Velkou výhodou je aktivace svalových souher bez aktivní spolupráce, dále pak také to, že ovlivňujeme celé tělo komplexně.

Aktivací těchto globálních modelů (vzorů) neučíme pacienta se plazit nebo otáčet, ale dílčí modely těchto vzorů představují stavební kameny pro bipedální lokomoci (chůzi po dvou).

Terapeutické modely aktivujeme prostřednictvím aktivačních zón, práce s jednotlivými polohami a zónami se řídí dle stavu pacienta a technických schopností domácího terapeuta (rodiče), o čemž rozhoduje ošetřující terapeut.

Základní vzory jsou tyto:

Reflexní otáčení (RO)- aktivujeme v poloze na zádech, nebo na boku, lokomoční model končí v lezení na čtyřech

Reflexní plazení (RP)- aktivujeme v poloze na břiše, výsledný impuls směrem kraniálním (dopředu)

První pozice (1.pozice)- aktivujeme v kleku na kolenou, výsledný impuls směrem do vertikály

Proti vznikající motorické aktivitě klademe adekvátní odpor, který vznikající motorickou aktivitu zesiluje.

Co očekáváme:

- Fyziologické nastavení páteře, hlavy a všech kloubů
- Diferenciaci funkcí svalů (rozdělení na opěrnou a pohybovou funkci)
- Rozvinutí hrudníku (změna postavení žebér a změna dýchání)
- Koordinaci orofaciální oblasti (oblasti obličeje- lepší fonace a artikulace, lepší koordinace očí)
- Koordinace polykání a žvýkání
- Koordinace pohybu očí v souvislosti a nastavením hlavy, šíje a trupu
- Pozitivní ovlivnění sfinkterů (svěračů)

Indikace VRL = na co se VRL používá (v dětském i dospělém věku):

- Vývojové problémy vzpřimování
- Syndrom šikmého krku
- Tortikolis
- Centrální koordinační porucha (CKP)
- Centrální parézy v dětském i dospělém věku
- Neuromuskulární onemocnění
- Genetické syndromy s poruchou motorické funkce
- Potíže se žvýkáním, polykáním, s řečí a šilháním
- Spina bifida
- Arthrogryposis multiplex congenita
- Ortopedické vady nohou (pes equinovarus), vady hrudníku, dysplazie kyčlí
- Skoliosy, vadné držení těla s poruchou motorické funkce, potíže s udržením rovnováhy, vnímání těla a prostoru
- Periferní parézy při nepoškozeném alfa motoneuronu
- Periarthritis humeroscapularis
- Insuficience pánevního dna
- Vertebrogenní onemocnění v různých stádiích
- Interní Dg- dechové obtíže, astma bronchiale
- Chirurgické Dg- fraktura klíčku, končetin
- Stavy po operacích hrudníku, břicha, končetin a polytraumata
- Stav po cévní mozkové příhodě (CMP), Parkinsonův sy.

Kontraindikace VRL (kdy nepoužívat VRL)

- Horečka a katarální projevy dýchacích cest (teplota nad 38st, suchý kašel
(37-38 st nižší zátěž, při produktivním kašli nechat vykašlat, krátce odpočinout- poloha na boku- na zádech se kašlat nedá)
- Průjmové onemocnění a zvracení
- Gravidita
- 24hod po očkování neživou vakcínou
- 5-10 dní po očkování živou vakcínou (*Rotarix*)
- *Těžké mentální stavy*
- Vysoké dávky kortikoidů
- Onkologické diagnózy dle stavu pacienta (konzultovat s lékařem)
- Epilepsie (kompenzovaná- konzultovat s lékařem)

Změny barvy kůže a sliznic při zátěži v důsledku aktivace VRL

Blednutí okolo úst (konzultovat s lékařem, vždy nechat „vydýchat“ na stole a pak opět znovu aktivovat)

Během aktivace dítě může celé mramorově promodrávat v důsledku zatížení, nezralého cévního systému, po přerušení aktivace se barva vrací k normálu. U starších dětí (2.trimenon) konzultovat zátěž s pediatrem.

Pláč při terapii je pro dítě prostředkem pro komunikaci (používá jej, když chce něčeho dosáhnout). Při terapii obvykle neznámá bolest, ale protest proti námaze, která je naší terapií provokována, a proti diskomfortu, ve kterém se dítě momentálně nachází. Terapeut pracuje ve předem definované poloze a užívá odpovídající tlak pro zónovou stimulaci.

Byl jsem poučen o rizicích a přínosech terapie a souhlasím s Vojtovou reflexní terapií případně Akrální KO aktivační terapií či terapií Bazálních programů a podprogramů

Datum a podpis zákonného zástupce: